

## Instruks for urinanalyser

Dokumenttype:	Instruks for urinanalyser
Formål:	<p>Urinanalyser kan benyttes som oplysning vedrørende patientens rusmiddelbrug, og om den ordinerede substitutionsmedicin indtages korrekt. Ligeledes kan urinanalysen være et redskab til dialog med borgeren i forhold til udviklingen af dennes behandling. Urinanalysen benyttes ligeledes som led i at evaluere og planlægge den samlede helhedsorienteret sociale og sundhedsfaglige behandlingsindsats for borgeren til at evaluere og planlægge den kognitive behandling af patienten.</p> <p>Urinanalysen skal ligeledes sikre, at et givent resultat vil få individuel behandlingsmæssige konsekvenser ud fra en faglig vurdering ex. i form af ændret dosis eller udleverings form.</p>
Gældende for faglig målgruppe:	Ansatte som har borgerrelaterede sundhedsopgaver i Substitutionsbehandlingen. Dette er social og sundhedsassistenter, misbrugsbehandlere og sygeplejersker.
Borgermålgruppe:	Borgere som er indskrevet i Substitutionsbehandlingen iht. Sundhedslovens §142, Servicelovens § 101.
Indikation:	<p>Lægen skal informere borgeren om formålet med urinanalysen og resultatet fra denne. Borgeren skal orienteres om, at resultatet ikke kan medføre udskrivelse fra behandlingen. Borgeren skal give samtykke til urinanalysen, såfremt dette ikke sker, bør lægen tilrettelægge behandlingen i forhold til de manglende oplysninger.</p> <p>Resultatet af urinanalysen er omfattet af sundhedslovens bestemmelser om tavshedspligt.</p> <p>I henhold til servicelovens § 153 vedrørende Skærpet underretningspligt skal der ved begrundet bekymring for hjemmeboende børns trivsel, eller bekymring i forbindelse med samkvem med mindreårige børn, laves underretning til Center Familie og Handicap Rebild mail: <a href="mailto:unde@rebild.dk">unde@rebild.dk</a></p>
Procedure / fremgangsmåde	<p>Det tilstræbes at borgeren giver samtykke til urinanalyser ved opstart og genopstart af substitutionsbehandlingen.</p> <p>Som analysemetode bør der anvendes screening stiks til urinanalyser, der hvor det er muligt, man bør dog være opmærksom på at sikkerheden af anvendelse af denne test er noget mindre end ved laboratorie analyse. Derfor skal personalet opveje risiko for forkert svar.</p> <p>Det kan over en fastlagt periode være nødvendigt og tjekke om anden medicin kan have indvirkning på substitutionsbehandlingen.</p>

**Kategori:** instruks  
**Ansvarligt center:** Sundhedscenteret  
**Ansvarlig leder:** Leder af Rusmiddelteamet  
**Udarbejdet af:** Rusmiddelteamet  
**Opdateret:** november 2022  
**Version:** 1



Ansvar og organisering:	Samtykke til urinalyser som behandlings indikation indhentes af lægekonsulenten og det ansatte personale ved hver påbegyndt urinalyse. Ligeledes gøres borgeren opmærksom på formålet med analysen.
Referencer:	<a href="https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/narkotika/~media/796D337DC66D4F72A8991141B88BD699.ashx">https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/narkotika/~media/796D337DC66D4F72A8991141B88BD699.ashx</a>