

Anafylaktisk shock

Gældende for sundhedsfaglige medarbejdere ansat i Center Pleje og Omsorg.

ANAFYLAKTISK SHOCK

Adrenalinampuller SKAL medbringes når der gives injektion (OBS udløbsdato)

Årsager til anafylaktisk shock	<p>Anafylaktisk shock er en kraftig og livsfarlig allergisk reaktion på fx:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lægemidler<ul style="list-style-type: none">○ Tabletter○ Injektion• Dyre- eller insektgift, fx:<ul style="list-style-type: none">○ Bi- eller Hvepsestik• Fødevareallergi <p>De hyppigste årsager til anafylaktisk shock udenfor sygehuset er:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penicillin• Insektstik.
Symptomer	<p>De hyppigste symptomer er:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kløe på kroppen, fx:<ul style="list-style-type: none">○ Hovedbund○ Øregang○ Håndflader○ Fodsåler• Løbende øjne• Slaphedsfornemmelse• Svimmelhed• Uro/angst• Åndedrætsbesvær• Hjertebanken• Hæshed• Varmefølelse i kroppen• Bleg, koldsved• Kvalme/opkast
Behandling	<p>OBS følg procedure i VAR.</p> <ul style="list-style-type: none">• Der skal straks injiceres adrenalin injektionsvæske 1 mg/ml i følgende dosis:<ul style="list-style-type: none">○ Voksne og børn ≥ 25 kg.: 0,3 mg i.m. = 0,3 ml. (Evt. gentaget)○ Børn < 25 kg.: 0,15 mg = 0,15 ml. (Evt. gentaget)• Injektionen gives dybt intramuskulært omkring det sted, hvor fx lægemidlet er givet.<ul style="list-style-type: none">○ Dels for at modvirke absorptionen af det allergifremkaldende præparat, dels for at modvirke det allergiske shock.• Umiddelbar efter injektion Adrenalin skal der ringes 1-1-2.• Efterfølgende sikres korrekt lejring af patienten, liggende med benene opad for at sikre blodtilførsel til hjerte og hjerne og etabler frie luftveje.• Hvis patientens tilstand efter nogle minutters forløb ikke er bedret væsentligt, kan det være nødvendigt at gentage injektionen med endnu en dyb intramuskulær injektion af samme dosis.• Imens afventes ankomst af ambulance/præhospital beredskab.