

## REAGÉR - på det du ser!

### Blodsukkermåling

- Vask hænder.
- Sæt teststrimmel i måleapparatet.
- Gør fingerprikker klar.
- Vælg siden af en finger eller øreflip.
- Prik hul i huden.
- Pres en bloddråbe frem.
- Sug bloddråben op med teststrimmelen.
- Aflæs resultatet og noter i Care under målinger.
- Aftør borgeres finger eller øreflip.
- Smid nål og teststrimmel i kanyleboks.

**Normalværdier for fasteblodsukker 3,6 – 6,0 mmol/L**

**Normalværdier for ikke faste blodsukker 6-8 mmol/L**

## REAGÉR - på det du ser!

### Blodsukkermåling

- Vask hænder.
- Sæt teststrimmel i måleapparatet.
- Gør fingerprikker klar.
- Vælg siden af en finger eller øreflip.
- Prik hul i huden.
- Pres en bloddråbe frem.
- Sug bloddråben op med teststrimmelen.
- Aflæs resultatet og noter i Care under målinger.
- Aftør borgeres finger eller øreflip.
- Smid nål og teststrimmel i kanyleboks.

**Normalværdier for fasteblodsukker 3,6 – 6,0 mmol/L**

**Normalværdier for ikke faste blodsukker 6-8 mmol/L**

## REAGÉR - på det du ser!

### Blodsukkermåling

- Vask hænder.
- Sæt teststrimmel i måleapparatet.
- Gør fingerprikker klar.
- Vælg siden af en finger eller øreflip.
- Prik hul i huden.
- Pres en bloddråbe frem.
- Sug bloddråben op med teststrimmelen.
- Aflæs resultatet og noter i Care under målinger.
- Aftør borgeres finger eller øreflip.
- Smid nål og teststrimmel i kanyleboks.

**Normalværdier for fasteblodsukker 3,6 – 6,0 mmol/L**

**Normalværdier for ikke faste blodsukker 6-8 mmol/L**

## REAGÉR - på det du ser!

### Blodsukkermåling

- Vask hænder.
- Sæt teststrimmel i måleapparatet.
- Gør fingerprikker klar.
- Vælg siden af en finger eller øreflip.
- Prik hul i huden.
- Pres en bloddråbe frem.
- Sug bloddråben op med teststrimmelen.
- Aflæs resultatet og noter i Care under målinger.
- Aftør borgeres finger eller øreflip.
- Smid nål og teststrimmel i kanyleboks.

**Normalværdier for fasteblodsukker 3,6 – 6,0 mmol/L**

**Normalværdier for ikke faste blodsukker 6-8 mmol/L**