

## Faglig vejledning for anvendelse af subkutan kanyle ved terminale patienter

Gældende for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i Center Pleje og Omsorg samt i Biformen Søparken, Center Familie og Handicap.

<b>Formål</b>	At sikre faglig korrekt håndtering af medicinering i Subkutan kanyle til den terminale patient.
<b>Definition af begreber</b>	Subkutan kanyle benævnes herefter tegnestift.
<b>Procedure anlæggelse, indgift, skift samt fjernelse af tegnestift</b>	<p><b>Se gældende VAR procedure ”Subkutan kanyle: Fjernelse”:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>I Rebild Kommune benyttes Neria Guard se VAR Lokal handlingsanvisning for “Producere, anlæggelse, indgift samt fjernelse af Neria Guard tegnestift”, som ligger som <b>“Administration af bolusinjektion i subkutan kanyle uden skylning”</b></li></ul> <p>Link til direkte adgang: <a href="https://www.varportal.dk/portal/procedure/61015/17">https://www.varportal.dk/portal/procedure/61015/17</a></p> <p>Ellers se nedenstående fremgangsmåde:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Startside</li><li>Procedurer</li><li>Lægemiddelhåndtering</li><li>Injektioner og infusioner</li><li>Subkutan kanyle</li><li>Administration af bolusinjektion i subkutan kanyle uden skylning</li></ol>
<b>Medicin</b>	<p><b>Når patienten ikke længere kan indtage tablet pr os bør patienten overgå til injektionsmedicin.</b></p> <p><b>Desuden ved:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kvalme og opkast.</li><li>Mistanke om reduceret optagelse af peroral medicin.</li><li>Næsten al medicin der kan gives intramuskulært, må også gives subkutant.</li><li>Max. Volumen pr. injektion er 4 ml pr. tegnestift.</li><li>Hvis der ønskes yderlig medicin injektion i samme tegnestift skal der afventes i 10- 15 min. (kilde 3)</li></ul> <p><b>Medicin, der kan gives i samme tegnestift eller er blandbare i pumpe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Oxycodon:</u><ul style="list-style-type: none"><li>✓ Oxycodone</li><li>✓ Lindoxa</li></ul></li><li><u>Morfin ukonserveret:</u><ul style="list-style-type: none"><li>✓ Methadon:</li><li>✓ Metadon</li></ul></li><li><u>Midazolam:</u><ul style="list-style-type: none"><li>✓ Midazolam</li><li>✓ Dormicum</li></ul></li><li><u>Haloperidol</u><ul style="list-style-type: none"><li>✓ Serenase</li></ul></li><li><u>Glycopyrron:</u><ul style="list-style-type: none"><li>✓ Robinul</li></ul></li><li><u>Levomepromazin:</u><ul style="list-style-type: none"><li>✓ Nozinan</li></ul></li><li><u>Furosemid:</u><ul style="list-style-type: none"><li>✓ Furix</li></ul></li><li><u>Diazepam:</u><ul style="list-style-type: none"><li>✓ Stesolid</li></ul></li><li><u>Hyoscinbutylbromid:</u><ul style="list-style-type: none"><li>✓ Buscopan</li></ul></li></ul>

	<p><b>Medicin som skal gives i særskilt tegnestift:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Binyrebarkhormon:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Methylprednisolon</li> <li>✓ Solu-medrol</li> <li>✓ Solu-cortef</li> </ul> </li> <li>• <u>Relistor</u></li> <li>• <u>Stesolid emulsion</u></li> <li>• <u>Esomeprazol</u></li> <li>• <u>Olanzapin</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zyprexa</li> </ul> </li> <li>• <u>Metoclopramid</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Primperan</li> </ul> </li> <li>• <u>Morfin konserveret</u> (hætteglas)</li> </ul> <p><b>(Kilde 1)</b></p>
<p><b>Kompetencefordeling ved medicin-administration</b></p>	<p><b>SSA's kompetencer i forhold til Subkutan-medicinering i tegnestift (Se kilde 2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SSA må anlægge/skifte tegnestift.</li> <li>• SSA må give fast medicin i tegnestift.</li> <li>• SSA må ligeledes oplære andre SSA'er.</li> </ul> <p><b>PN-medicin ved Subkutan-medicinering (Se kilde 2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SSA SKAL kontakte spl. ved behov for PN-medicin injektion.</li> <li>• Sygeplejerske vurderer, om der er behov for et besøg af sygeplejerske til vurdering af situationen eller om situationen kan vurderes pr tlf. sammen med SSA.</li> </ul>
<p><b>Kompetencefordeling ved medicin-administration</b></p>	<p><b>Specielt omkring Metadon til den terminale patient (jf. lokal beslutning i CPO Rebild Kommune):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metadon til injektion SKAL altid administreres af sygeplejerske.</li> <li>• Medicindispensering med tablet Metadon SKAL dispenseres af sygeplejen.</li> </ul>
<p><b>Medicinbestilling og opbevaring af anbrudte ampuller</b></p>	<p>Bestilling af medicin samt opbevaring af an brudt medicin.                  Der bestilles løbende medicin.                  Senest torsdag bestilles beregnet behov af medicin henover weekend til og med mandag.</p> <p>OBS anbrudte ampuller <b>SKAL</b> kasseres efter hver indgift.                  Der må <b>IKKE</b> trækkes op i sprøjte og gemmes til næste injektion.</p>
<p><b>Kilder</b></p>	<p>VARhealthcare procedurer:                  Procedureerne findes via Borgeroverblik; Genvej til Instrukser; VAR – Praktiske procedurer i sygeplejen.</p> <p><b>Kilde 1:</b>                  Subkutan medicinering hos patienter med behov for palliation: <a href="#">Subkutan medicinering hos patienter med behov for palliation (rn.dk)</a></p> <p><b>Kilde 2:</b>                  Se avis.rebild.dk; Pleje og Omsorg -&gt; Sundhedsfaglige instrukser -&gt; Journalføring, delegering og faglige kompetencebeskrivelse -&gt; Terminal pleje</p> <p><b>Kilde 3:</b>                  Pri.rn.dk , subkutan kanyle</p>