

## Procedure ved rødme

- Er den personlig hygiejne ved borger sufficient?
- Observer/lugt om det evt. er svamp eller bare rødme.

### Trin:

1. Hvis der er rødme i folden (lyske / bryst / mave), vaskes dagligt med sæbe og vand, sørg for at huden er grundigt tør (duppes tørt eller lufttørring, ikke gnide) og der lægges bomuldsklude i folden i 2 døgn. Disse skiftes og evalueres hver dag. Hvis der ingen forbedring er skal man gå videre til næste trin.

2. Hvis der observeres hvid belægning og tiltagende lugtgener, kan dette være et tegn på begyndende svampeinfektion. Handling herpå er daglig afvask med vand og sæbe, sørg for at huden er grundigt tør (duppes tørt eller lufttørring) og herefter Sorbact bomuldsmeche i folden og/eller Abrilet ved fugtige folder. HUSK kontakt til sygeplejersken, hvis der er mistanke om svampeinfektion, mhp evt. behandling.

3. Hvis der er hudløse og væskende områder, smøres da med tyndt lag Inotylol dagligt. OBS dette skal fjernes med madolie inden der smøres med nyt lag, herefter handling, som i trin 2. Hvis herefter heller ingen effekt, kontaktes sygeplejerske med henblik på anden behandling, fx "røde" bade.

**OBS! Der SKAL udarbejdes sygeplejeindsats på rødme, fx "rødme i lyske/bryst/mavefold"**

## Procedure ved rødme

- Er den personlig hygiejne ved borger sufficient?
- Observer/lugt om det evt. er svamp eller bare rødme.

### Trin:

1. Hvis der er rødme i folden (lyske / bryst / mave), vaskes dagligt med sæbe og vand, sørg for at huden er grundigt tør (duppes tørt eller lufttørring, ikke gnide) og der lægges bomuldsklude i folden i 2 døgn. Disse skiftes og evalueres hver dag. Hvis der ingen forbedring er skal man gå videre til næste trin.

2. Hvis der observeres hvid belægning og tiltagende lugtgener, kan dette være et tegn på begyndende svampeinfektion. Handling herpå er daglig afvask med vand og sæbe, sørg for at huden er grundigt tør (duppes tørt eller lufttørring) og herefter Sorbact bomuldsmeche i folden og/eller Abrilet ved fugtige folder. HUSK kontakt til sygeplejersken, hvis der er mistanke om svampeinfektion, mhp evt. behandling.

3. Hvis der er hudløse og væskende områder, smøres da med tyndt lag Inotylol dagligt. OBS dette skal fjernes med madolie inden der smøres med nyt lag, herefter handling, som i trin 2. Hvis herefter heller ingen effekt, kontaktes sygeplejerske med henblik på anden behandling, fx "røde" bade.

**OBS! Der SKAL udarbejdes sygeplejeindsats på rødme, fx "rødme i lyske/bryst/mavefold"**

## Procedure ved rødme

- Er den personlig hygiejne ved borger sufficient?
- Observer/lugt om det evt. er svamp eller bare rødme.

### Trin:

1. Hvis der er rødme i folden (lyske / bryst / mave), vaskes dagligt med sæbe og vand, sørg for at huden er grundigt tør (duppes tørt eller lufttørring, ikke gnide) og der lægges bomuldsklude i folden i 2 døgn. Disse skiftes og evalueres hver dag. Hvis der ingen forbedring er skal man gå videre til næste trin.

2. Hvis der observeres hvid belægning og tiltagende lugtgener, kan dette være et tegn på begyndende svampeinfektion. Handling herpå er daglig afvask med vand og sæbe, sørg for at huden er grundigt tør (duppes tørt eller lufttørring) og herefter Sorbact bomuldsmeche i folden og/eller Abrilet ved fugtige folder. HUSK kontakt til sygeplejersken, hvis der er mistanke om svampeinfektion, mhp evt. behandling.

3. Hvis der er hudløse og væskende områder, smøres da med tyndt lag Inotylol dagligt. OBS dette skal fjernes med madolie inden der smøres med nyt lag, herefter handling, som i trin 2. Hvis herefter heller ingen effekt, kontaktes sygeplejerske med henblik på anden behandling, fx "røde" bade.

**OBS! Der SKAL udarbejdes sygeplejeindsats på rødme, fx "rødme i lyske/bryst/mavefold"**

## Procedure ved rødme

- Er den personlig hygiejne ved borger sufficient?
- Observer/lugt om det evt. er svamp eller bare rødme.

### Trin:

1. Hvis der er rødme i folden (lyske / bryst / mave), vaskes dagligt med sæbe og vand, sørg for at huden er grundigt tør (duppes tørt eller lufttørring, ikke gnide) og der lægges bomuldsklude i folden i 2 døgn. Disse skiftes og evalueres hver dag. Hvis der ingen forbedring er skal man gå videre til næste trin.

2. Hvis der observeres hvid belægning og tiltagende lugtgener, kan dette være et tegn på begyndende svampeinfektion. Handling herpå er daglig afvask med vand og sæbe, sørg for at huden er grundigt tør (duppes tørt eller lufttørring) og herefter Sorbact bomuldsmeche i folden og/eller Abrilet ved fugtige folder. HUSK kontakt til sygeplejersken, hvis der er mistanke om svampeinfektion, mhp evt. behandling.

3. Hvis der er hudløse og væskende områder, smøres da med tyndt lag Inotylol dagligt. OBS dette skal fjernes med madolie inden der smøres med nyt lag, herefter handling, som i trin 2. Hvis herefter heller ingen effekt, kontaktes sygeplejerske med henblik på anden behandling, fx "røde" bade.

**OBS! Der SKAL udarbejdes sygeplejeindsats på rødme, fx "rødme i lyske/bryst/mavefold"**