

# STOP – TÆNK - TJEK

<b>STOP</b> 	<b>TÆNK</b> 	<b>TJEK</b> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vær særlig opmærksom på:

- Insulin**
- Blodfortyndende medicin**
- Digoxin**
- Gentamicin**
- Kalium**
- Methotrexat**
- Opioider**



#stoptaenktjek

  
STYRELSEN FOR  
**PATIENTSIKKERHED**  
Stps.dk/stoptaenktjek

**pro.medicin**  
Pro.medicin.dk/stoptaenktjek

**Insulin.** Vær opmærksom på, at doseringen af insulin afhænger af værdien af borgerens blodsukker. Undgå forveksling af insulinpenne.

**Blodfortyndende medicin.** Vær opmærksom ved operation – er noget ændret i behandlingen?  
Vær opmærksom på INR, hos borgere der får warfarin.

**Digoxin.** Undgå forveksling af styrker, og vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet.

**Gentamicin.** Vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet. Vær opmærksom ved nedsat nyrefunktion.

**Kalium.** Vær opmærksom på, at oral opløsning ikke må gives i.v. Vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet.

**Methotrexat.** Gives kun én gang om ugen ved leddegigt og psoriasis. Overdosering kan være dødelig.

**Opioider.** Vær opmærksom på symptomer på overdosering; virker borgeren sløv, træt eller forvirret?  
Husk at fjerne det gamle opioidplaster, før du sætter et nyt på huden.

*September 2019*