

Lommekort til dig og din kollega



STOP	TÆNK	TJEK
Vær særlig opmærksom på:		
Insulin		
Blodfortyndende medicin		
Digoxin		
Gentamicin		
Kalium		
Methotrexat		
Opioider		
		#stoptaentjek
STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED Stps.dk/stoptaentjek		pro.medicin Pro.medicin.dk/stoptaentjek

<p>Insulin. Vær opmærksom på, at doseringen af insulin afhænger af værdien af borgerens blodsukker. Undgå forveksling af insulinpenne.</p> <p>Blodfortyndende medicin. Vær opmærksom ved operation – er noget ændret i behandlingen? Vær opmærksom på INR, hos borgere der får warfarin.</p> <p>Digoxin. Undgå forveksling af styrker, og vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet.</p> <p>Gentamicin. Vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet. Vær opmærksom ved nedsat nyrefunktion.</p> <p>Kalium. Vær opmærksom på, at oral opløsning <u>ikke</u> må gives i.v. Vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet.</p> <p>Methotrexat. Gives kun én gang om ugen ved leddegigt og psoriasis. Overdosering kan være dødelig.</p> <p>Opioider. Vær opmærksom på symptomer på overdosering; virker borgeren sløv, træt eller forvirret? Husk at fjerne det gamle opioidplaster, før du sætter et nyt på huden.</p> <p style="text-align: right;">September 2019</p>	<p>Insulin. Vær opmærksom på, at doseringen af insulin afhænger af værdien af borgerens blodsukker. Undgå forveksling af insulinpenne.</p> <p>Blodfortyndende medicin. Vær opmærksom ved operation – er noget ændret i behandlingen? Vær opmærksom på INR, hos borgere der får warfarin.</p> <p>Digoxin. Undgå forveksling af styrker, og vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet.</p> <p>Gentamicin. Vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet. Vær opmærksom ved nedsat nyrefunktion.</p> <p>Kalium. Vær opmærksom på, at oral opløsning <u>ikke</u> må gives i.v. Vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet.</p> <p>Methotrexat. Gives kun én gang om ugen ved leddegigt og psoriasis. Overdosering kan være dødelig.</p> <p>Opioider. Vær opmærksom på symptomer på overdosering; virker borgeren sløv, træt eller forvirret? Husk at fjerne det gamle opioidplaster, før du sætter et nyt på huden.</p> <p style="text-align: right;">September 2019</p>
---	---

Ombukkes
←

