

REAGÉR - på det du ser!

Symptomer på urinvejsinfektion/UVI

Her følger de symptomer du skal være opmærksom på, hvis du mistænker borgeren for urinvejsinfektion:

- Feber (>38°C) eller kuldegysninger
- Nye eller øgede smerter (svien og skæren) ved vandladningen
- Ny suprapubisk ømhed eller lændesmerter
- Urinen har ændret karakter (eller lugt)
- Forværring af mental eller fysisk status
- Hyppig vandladning (polyuri)
- positiv urindyrk med >105 kolonier/ml, urin med max. 2 forskellige mikroorganismer og positiv urinstik for leukocytter

Bakterier i urinen uden symptomer, vurderes af læge og er ikke ensbetydende med UVI.

REAGÉR - på det du ser!

Symptomer på urinvejsinfektion/UVI

Her følger de symptomer du skal være opmærksom på, hvis du mistænker borgeren for urinvejsinfektion:

- Feber (>38°C) eller kuldegysninger
- Nye eller øgede smerter (svien og skæren) ved vandladningen
- Ny suprapubisk ømhed eller lændesmerter
- Urinen har ændret karakter (eller lugt)
- Forværring af mental eller fysisk status
- Hyppig vandladning (polyuri)
- positiv urindyrk med >105 kolonier/ml, urin med max. 2 forskellige mikroorganismer og positiv urinstik for leukocytter

Bakterier i urinen uden symptomer, vurderes af læge og er ikke ensbetydende med UVI.

REAGÉR - på det du ser!

Symptomer på urinvejsinfektion/UVI

Her følger de symptomer du skal være opmærksom på, hvis du mistænker borgeren for urinvejsinfektion:

- Feber (>38°C) eller kuldegysninger
- Nye eller øgede smerter (svien og skæren) ved vandladningen
- Ny suprapubisk ømhed eller lændesmerter
- Urinen har ændret karakter (eller lugt)
- Forværring af mental eller fysisk status
- Hyppig vandladning (polyuri)
- positiv urindyrk med >105 kolonier/ml, urin med max. 2 forskellige mikroorganismer og positiv urinstik for leukocytter

Bakterier i urinen uden symptomer, vurderes af læge og er ikke ensbetydende med UVI.

REAGÉR - på det du ser!

Symptomer på urinvejsinfektion/UVI

Her følger de symptomer du skal være opmærksom på, hvis du mistænker borgeren for urinvejsinfektion:

- Feber (>38°C) eller kuldegysninger
- Nye eller øgede smerter (svien og skæren) ved vandladningen
- Ny suprapubisk ømhed eller lændesmerter
- Urinen har ændret karakter (eller lugt)
- Forværring af mental eller fysisk status
- Hyppig vandladning (polyuri)
- positiv urindyrk med >105 kolonier/ml, urin med max. 2 forskellige mikroorganismer og positiv urinstik for leukocytter

Bakterier i urinen uden symptomer, vurderes af læge og er ikke ensbetydende med UVI.