

Faglig vejledning til behandling af akut allergisk shock ifm. indgift af lægemiddel.

Gældende for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i Center Pleje og Omsorg samt i Boformen Søparken, Center Familie og Handicap.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Formål | At kunne iværksætte omgående behandling af allergisk shock opstået i tilslutning til indgift af lægemiddel |
| Definition | Allergisk reaktion i forbindelse med injektion af lægemiddel. |
| Forholdsregler | <p>Der er en sjælden risiko i forbindelse med enhver injektionsbehandling. Inden der gives en injektion med et lægemiddel, bør patienten udspørges, om der tidligere har været tegn på allergi i forbindelse med injektion eller indtagelse af det pågældende lægemiddel. Hvis dette er tilfældet, bør lægen rådspørges, inden injektionen gives.</p> <p>Efter injektionen bør SPL/SSA blive hos patienten i ca. 15 minutter for at observere for evt. allergisk shock.</p> <p>*OBS Adrenalin beredskab ved injektion af insulin kan undlades (Se under Lovgrundlag).</p> |
| Adrenalin | <p>Adrenalin skal medbringes, når der gives injektion.</p> <p>Medbring 2 ampuller ved hver inj. subcutant eller intramuskulær.</p> <p>OBS: Udløbsdato på adrenalin. Holdbarhed udenfor køleskab er 6 måneder. Dato for hvornår ampullerne er taget ud af køleskabet, skal stå angivet på ampullerne/posen de opbevares i.</p> <p>OBS: Adrenalin ”Bradex” https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/8565 skal ikke opbevares på køl, men kan derimod holde sig til dato på ampul.</p> |
| Symptomer på allergisk shock | <ul style="list-style-type: none"> • Kløe på kroppen, fx hovedbund, øregang, håndflader og fodsåler. • Slaphedsfornemmelse, svimmelhed, uro eller angst. • Åndedrætsbesvær, hæshed, varmfølelse i kroppen, hjertebanken, bleg, koldsved, evt. kvalme og opkast. |
| Behandling af allergisk shock | <p>Et svært, akut allergisk shock optræder oftest få minutter efter injektionen.</p> <p>Inden adrenalininjektionen gives, bør man på sædvanlig vis kontrollere, at kanylen ikke ligger i en blodåre. Vejledning i VAR følges.</p> <p>Der skal straks injiceres adrenalin injektionsvæske 1 mg/ml i følgende dosis:</p> <p>Voksne og børn ≥ 25 kg.: 0,3 mg i.m. = 0,3 ml. (Evt. gentaget)</p> <p>Børn < 25 kg.: 0,15 mg = 0,15 ml. (Evt. gentaget)</p> <p>Link: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Rationel-Farmakoterapi-1-2021/Anafylaksi-i-almen-praksis</p> <p>Injektionen gives dybt intramuskulært omkring det sted, hvor lægemidlet er givet. Dels for at modvirke absorptionen af det allergifremkaldende præparat, dels for at modvirke det allergiske shock.</p> <p>Umiddelbar efter injektion Adrenalin skal der ringes 1-1-2. Efterfølgende sikres korrekt lejring af patienten, liggende med benene opad for at sikre blodtilførsel til hjerte og hjerne og etabler frie luftveje.</p> <p>Hvis patientens tilstand efter nogle minutters forløb ikke er bedret væsentligt, kan det være nødvendigt at gentage injektionen med endnu en dyb intramuskulær injektion af samme dosis. Imens afventes ankomst af ambulance/præhospital beredskab.</p> |
| Lovgrundlag | <p>Sundhedsstyrelsens ”Ophævelse af vejledning til hjemmesygeplejeordninger om behandling af akut allergisk shock med injektion af adrenalin”, d. 04.07.2017.</p> <p>https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2017/Notat-vedr,-d,-oph%C3%A6velse-af-vejledning-til-hjemmesygeplejen.ashx?la=da&hash=3C4F43898533B226AE2E55B0FE3FA7E4833E9B7C</p> <p>*September 2018: Sagsnr: 4-1212-206/1 Forholdsregler ved injektion af insulin https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/forholdsregler-ved-injektion-af-insulin</p> |
| Praksis konsulent | Ovenstående vejledning er drøftet og tilrettet i samarbejde med Rebild Kommunes praksiskonsulent i oktober 2021. |

Kategori: Faglig vejledning

Ansvarligt center: Center Pleje og Omsorg

Ansvarlig leder: Leder af Sygeplejens Akut- og Rehabiliteringstilbud

Opdateret: 28.12.2021 (MAVE)

Version: 5

Skal opdateres igen: Ved behov og mindst én gang årligt

