



Flowchart – Behandling af obstipation


Gældende for sygeplejersker ansat i Center Pleje og Omsorg

Egen læge orienteres via MedCom ved opstart eller ændringer i behandlingen.

Medicinen oprettes som en lokalordination i FMK.

SSA skal henvende sig til sygeplejen ved behov for opstart af eller ændringer i behandling for obstipation.

OBS Hvis borger bliver indlagt, skal præparat og dosis oplyses i den supplerende indlæggelsesrapport.



Der skabes overblik over borgeren i hhv. helbredstilstand, væske- og bristolskema samt den sidste uges observationer.

Kontakt læge eller vagtlæge.

Foreslå fosfat klyx eller udredning af årsag.

Orienter egen læge efter indsats med forslag til fremadrettet plan.

Osmotisk virkende laxantia:

Mixt. Lactulose 15 ml. stigende med 15. ml. til højst 45 ml. x 1.

Pulver Macrogol med elektrolytter (fx Gangiden, Movicol) 1 brev x 1 stigende til 2 breve (evt. fordelt over 2 gange dagligt)

Peristaltikfremmende laxantia:

Dr. Picosulfat 10 dr. stigende med 10 dr. til 20 dr. x 1

ELLER tabl. Bisacodyl 10 mg. stigende med 10 mg. til 20 mg. x 1

ELLER Klyx Glyoktyl

ELLER Supp. Bisacodyl 10 mg.

OBS

Ved akut opstået obstipation uden indikation eller manglende afføring i 2-3 dage, kan der anvendes 8 breve Pulver Macrogol med elektrolytter, som indtages over 6 timer – dvs. 2 breve hver 2. time.