



## Aftaler i forhold til administration af substitutionsmedicin

|                                                                             |                                 |                                          |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klientens navn                                                              |                                 |                                          |                                                                                                                      |
| Cpr. Nr.                                                                    |                                 |                                          |                                                                                                                      |
| Medicinordination                                                           |                                 |                                          |                                                                                                                      |
| Ordinerende læge                                                            |                                 |                                          |                                                                                                                      |
| Hvor og hvordan skal medicinen bestilles?                                   |                                 |                                          |                                                                                                                      |
| Forholdsregler mht. udlevering af medicin når klienten er påvirket          | <b>Hvis alkoholpromille er:</b> |                                          |                                                                                                                      |
|                                                                             | Promille                        |                                          | Klinisk vurdering                                                                                                    |
|                                                                             | 0 -0,5 promille                 | fuld dosis substitutionsmedicin          | klinisk vurdering beskrives.                                                                                         |
|                                                                             | 0,5 - 1 promille                | halv dosis substitutionsmedicin på dagen | Rusmiddelteamet kontaktes, klinisk vurdering beskrives.                                                              |
|                                                                             | 1 promille og der over          | ingen medicin.                           | Klinisk vurdering beskrives<br>Rusmiddelteamet kontaktes<br>vedr. fremtidig plan. Ny tid dagen efter, screenes igen. |
| Grænse for promille ved udlevering                                          |                                 |                                          |                                                                                                                      |
| Aftale om medgivelse af medicin ved pludselig afrejse                       |                                 |                                          |                                                                                                                      |
| Hvor skal medicinen tilsendes ved udskrivelse?                              |                                 |                                          |                                                                                                                      |
| Må klienten få medicin med på weekend/ferie?                                |                                 |                                          |                                                                                                                      |
| Hvor skal klienten henvende sig for substitutionsmedicin efter udskrivelse? |                                 |                                          |                                                                                                                      |

- Hvis en borger møder meget påvirket af andre stoffer, vil der blive foretaget en individuel skønsmæssig vurdering, om det er forsvarligt at udlevere den ordinerede medicin, Rusmiddelteamet/lægekonsulent/vagtlæge kontaktes.
- Journalføres og videre gives til Rusmiddelteamet.
- Hovedreglen er at undgå at udlevere medicin, hvis du er i tvivl. (se instruks den påvirkede borger)



## Definition

En borger som på baggrund af rusmiddelindtag har en ændret kognition og/eller adfærd **i forhold til det habituelle**

Ca. 275 personer dør årligt af en overdosis. Oftest er årsagen opioider i kombination med benzodiazepiner og/eller alkohol. I nogle tilfælde også metadon og centralstimulantia.

## Symptomer

| Type                             | Sløvende                                                                                                                   | Opkvikkende                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Rusmidler</b>                 | Cannabis<br>Benzodiazepiner<br>Opioider<br>Ketamin<br>Alkohol                                                              | Kokain<br>Amfetamin<br>MDMA<br>Methylphenidat           |
| <b>Kliniske fund, generelle</b>  | Døsig<br>Hængende øjenlåg<br>"Svømmende" øjne<br>Snøvlende og vrøvlende tale<br>Usikre bevægelser<br>Langsom reaktionsevne | Eufori<br>Hyperaktiv<br>Kaotisk<br>Rastløs<br>Aggressiv |
| <b>Kliniske fund, specifikke</b> | Små pupiller (opioider)<br>Røde øjne (cannabis)<br>Alkohol ånde (alkohol)                                                  | Store pupiller                                          |

Vær opmærksom på at nogle patienter kan have paradokse reaktioner på et givet rusmiddel. Nogle patienter vil således reagere med "sløvende symptomer" på opkvikkende rusmidler og omvendt. De generelle kliniske fund kan derfor kun bruges til at få mistanke om at patienten er påvirket, men ikke til at afgøre hvilke stof vedkommende er påvirket af.

