

Instruks for udeblivelse af afhentning af substitutionsmedicin.

Dokumenttype:	Retningslinje for udeblivelse /afhentning af substitutionsmedicin								
Formål:	Sikre ensrettet retningslinje for udeblivelse/ manglende afhentning af medicin.								
Gældende for faglig målgruppe:	Ansatte som har borgerrelaterede sundhedsopgaver i Substitutionsbehandlingen. Dette er rusmiddelbehandlere og sygeplejefagligt personale.								
Borgemålgruppe:	Borgere som er indskrevet i Substitutionsbehandlingen iht. Sundhedslovens §142, Servicelovens § 101.								
Håndtering:	Ved udeblivelser gives følgende medicin dosis på fremmøde-dagen. Efterfølgende dage gives den normale dosis: <table> <tr> <td>Udeblevet 1 dag</td><td>Fortsætter på samme dosis</td></tr> <tr> <td>Udeblevet 2 dage</td><td>2/3 af dosis</td></tr> <tr> <td>Udeblevet 3 dage</td><td>1/3 af dosis</td></tr> <tr> <td>Udeblevet 4 dage</td><td>(Anses som udtrappet)</td></tr> </table> (Uafhentet medicin modregnes, altid) Kontakt Rusmiddelteamet / lægekonsulent. Ved udeblivelser for Buprenorphine, skal man være opmærksom på at der kan være indtaget andre opioider, og der derfor kan opstå abstinenssymptomer ved indtag. Der kan gå op til 7 dage inden det er ude af kroppen. Alle som har haft udeblivelser skal som udgangspunkt have taget en urinprøve, inden de får medicin udleveret. Der kan dog være tilfælde f.eks. sygdom eller lignede hvorfra dette kan undlades. Lægen kontaktes såfremt der er udslag for andet end det forventede. Hvis en borger udebliver fra behandling og/eller ikke henter medicin udskrevet til udlevering på Sygeplejeklinikker/Sygeplejen kontaktes vedkommende, mht. årsag og evt. til muligheder for at reetablere ordinerede behandlingsplan. Det er vigtigt her at sikre at de psykosociale tilbud omkring borgeren er adækvate, og vurderet tilstrækkelige til at fastholde borgeren i behandling. Kontakt og hvad der er sagt dokumenteres i journalen, og lægen informeres om udeblivelsen. Desuden noteres efterfølgende reviderede plan. Hvis en borger udebliver i over 4 dage uden indtag af Metadon, og 4 dage for Buprenorphine, herunder apoteket, afsluttes i borgeren i vores regi. Det formodes jvf. vejledningen om substitutionsbehandlingen (11.11) at borgeren har akut udtappet sig selv, eller selv fundet løsning i form af misbrug. Der er derfor ikke længere grundlag for substitutions behandling, som i bedste fald er uden kontrol, og uden ønske for borgeren. I værste fald kan fortsat behandling være direkte livsfarligt. Der skal sandsynligvis flere sociale foranstaltninger og andre tilbud på banen for substitutionsbehandlingen kan påbegyndes igen. Substitutions behandlingen må som udgangspunkt ikke stå alene, hos denne målgruppe. Det er en supplerende der sammen med de andre psykosociale tilbud skal føre borgeren i bedring. Forsøg på kontakt, datoer for udeblivelse dokumenteres i journalen, og lægen kontaktes mht.om borger skal afsluttes, læge skrive beslutningsnotat i journal. Herefter seponere lægekonsulent medicinen i FMK.	Udeblevet 1 dag	Fortsætter på samme dosis	Udeblevet 2 dage	2/3 af dosis	Udeblevet 3 dage	1/3 af dosis	Udeblevet 4 dage	(Anses som udtrappet)
Udeblevet 1 dag	Fortsætter på samme dosis								
Udeblevet 2 dage	2/3 af dosis								
Udeblevet 3 dage	1/3 af dosis								
Udeblevet 4 dage	(Anses som udtrappet)								