

Instruks med henblik på vurdering af behandling med antipsykotika med fokus på forebyggelse af kardiovaskulær sygdom og type 2 -diabetes

Dokumenttype:	Instruks med henblik på vurdering af behandling med antipsykotika med fokus på forebyggelse af kardiovaskulær sygdom og type 2 -diabetes
Faglig målgruppe:	Sundhedspersonale / lægekonsulent der er involveret i modtagelse, udredning, behandling og observation af borgerne.
Målgruppe:	Borgere der henvender sig i substitutionsbehandling for en afhængighed af opioidmisbrug.
Formål:	Er at sikre borgere der er i antipsykotisk behandling ordineret af substitutionsbehandlingens læge, er patientsikkerhedsmæssigt forsvarlig og i henhold til vejledning om behandling med antipsykotisk medicin. Der fokuseres på forebyggelse af kardiovaskulær sygdom og type 2 -diabetes
Bivirkninger:	Bivirkning ved antipsykotika er QTc-forlængelse. Dette forudsætter opmærksomhed ved opstart af anden medicin samtidig med den antipsykotiske behandling
Vurdering:	Der skal som minimum fremgå følgende af journalen: • At vurdering af kardial risikoprofil er foretaget, herunder BT og EKG • At borgeren er henvist til kardiolog ved afvigelser i EKG og andre kardielle symptomer som bryst smerter, forpustet hed og åndenød. • At vægt, BMI og talje omfang følges. • At der tages kontrol af lipider og HbA1c (med fokus på forlænget QTc-interval) • At KRAM faktorerne er diskuteret med borgeren. • At der foreligger plan for behandling og tidspunkt for revurdering. • At der ved positive fund i forbindelse med screening og kontrol reageres med ex. dosisregulering, skift til andet præparat eller henvisning til speciallæge. • Lægekonsulent/Rusmiddelteamet kontakter praktiserende læge, som kan være behjælpelig med blodprøvetagning, EKG og opfølgning på dette.

Behandling:	Følgende skema kan følges ved behandling						
		Før behandling	2 uger	4 uger	8 uger	12 uger	årligt
Anamnese og klinisk vurdering							
Effekt/bivirkninger	X	X	X	X	X	X	X
Vægt/BMI	X	X	X	X	X	X	X
Taljeomfang	X						X
Blodtryk	X					X	X
HbA1c	X					X	X
Faste Plasmalipider	X	X				X	X
EKG	X	X				X	X
Referencer:	https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2014/Vejledning-om-beh-m-antipsykotiske-laegemidler-til-personer-over-18-aar-med-psykotiske-lidelse vejledning_1-2011-arytmi-dec2011.pdf (dpsnet.dk) Vejledning_kram.pdf (smds.dk)						