

## Blodsukker

Gældende for ufaglærte medarbejdere og SSH ansat i Hjemmeplejen og på ældrecenter i Center Pleje og Omsorg.

|  |   |
|--|---|
| <b>Intro</b>   | <p>Ved borgere med diabetes skal ændringer i tilstanden altid give anledning til at undersøge blodsukker.</p> <p>Kontakt SSA hvis du tror, at borgers blodsukker er for højt eller for lavt.</p> <p>Obs at symptomer på for højt/for lavt blodsukker kan variere meget fra borger til borger.</p> <p>Det er derfor væsentligt, at du orienterer dig i helbredstilstanden ”Problemer med fødeindtag”, hvor du under SYMPTOMER/KENDETEGN kan se, de kendte symptomer den pågældende borger har.</p> |
| <b>Symptomer på for højt blodsukker</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Øget tørst</li><li>• Hyppige vandladninger</li><li>• Træthed</li><li>• Hovedpine.</li></ul>   |
| <b>Symptomer på for lavt blodsukker</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sult</li><li>• Øget svedtendens</li><li>• Rysten</li><li>• Koncentrationsbesvær</li><li>• Hjertebanken</li><li>• Træthed.</li></ul>   |
| <b>Dokumentation ifm. borger har symptomer på for højt – eller lavt blodsukker</b> | <p>Når borger har for højt – eller for lavt blodsukker, er der noget, der fraviger det forventede eller planlagte.</p> <p>Du skal derfor dokumentere symptomerne samt dine øvrige observationer i en observation.</p>   |