

Forholdsregler ved borgere med Carbapenemase Producerende Organismer (CPO)

Gældende for medarbejdere i Center Pleje og Omsorg, Center Sundhed, Kultur og Fritid og i Boformen Søparken, Center Familie og Handicap.

Formål	At forholdsreglerne i instruksen følges, så vi forebygger smittespredning til patienter og personale.
Generelt	Infektioner med carbapenemase-producerende organismer kan medføre alvorlig sygdom hos især syge og svækkede, der har været indlagt flere gange på hospital, og har modtaget behandling med bredspektret antibiotika. CPO omfatter i denne sammenhæng: • Tarmbakterier • Miljøbakterier Infektioner med CPO findes oftest som urinvejsinfektion eller i sjældne tilfælde som luftvejsinfektion eller sårinfektion. For tarmbakterierne gælder at smitte ofte fører til en rask bærertilstand i tarmen, hvor tarmbakterier med CPO bliver en del af den normale tarmflora. For miljøbakterierne gælder, at de kan føre til en rask bærertilstand i svælget, på huden og sjældnere i tarmen. Bærertilstanden er ofte relateret til fremmedlegemer (kateter, venflon, cvk mv.). Både tarm- og miljøbakterier kan leve i flere måneder i miljøet (fx i afløb og på udstyr inkl. hjælpemidler).
Symptomer	Der er ikke nogen specielle kendetegn/symptomer på CPO, men da CPO gør bakterierne modstandsdygtige overfor de fleste typer antibiotika, er en infektion vanskelig at behandle. Derfor er det vigtigt, at der sendes mikrobiologisk prøve til dyrkning og resistens bestemmelse ved mistanke om behandlingskrævende infektion.
Smitte-måde	Smittemåde varierer med typen af CPO: • Tarmbakterierne smitter ved direkte og indirekte kontaktsmitte samt fækal-oral. • Miljøbakterierne smitter især ved direkte og indirekte kontakt. Den infektion der hyppigst forekommer med tarmbakterier, er urinvejsinfektion. Den infektion der hyppigst forekommer med miljøbakterier, er urinvejsinfektion i forbindelse med kateteranlæggelse. Den hyppigste smittevej for smitte med CPO er hænderne. Smitterisikoen minimeres derfor ved at udføre håndhygiejne, når det er påkrævet.
Forholds-regler Fortsætter på næste side	I primærsektoren må borgere med smitsom sygdom ikke isoleres, som under indlæggelse på hospitalet. Borgeren må frit deltage i sociale aktiviteter og genoptræning. Ved pleje, undersøgelse og behandling skal der, uanset om borgeren har infektion med CPO eller er rask smittebærer, tages specielle forholdsregler. • Da bærertilstanden for de fleste borgere er permanent, ophæves forholdsreglerne kun efter aftale med egen læge og/eller hygiejnesygeplejersken Værnemidler Ved direkte kontakt med borger, borgers udskillelser, snavsetøj og udstyr/inventar samt ved rengøring (inkl. sengeredning) anvendes handsker og langærmet engangsovertrækskittel over arbejdsdragten. • Brug af værnemidler kan kun fraviges, hvis man ikke har fysisk kontakt med borgeren, udstyr eller inventar, fx hvis der udelukkende skal gives en besked. ➤ Ved pleje af en borger, der har luftvejsinfektion med påvist CPO, anvendes mundbind inden for en meters afstand fra borgeren. ➤ Ved sugning af en borger med påvist CPO i luftvejene, skal der anvendes handsker, mundbind, visir og langærmet engangskittel. Håndhygiejne Hånddesinfektion (min. 30 sek.) efter direkte kontakt med borgeren eller kontaktflader, og altid når boligen forlades. Borgeren og besøgende skal informeres om vigtigheden af håndhygiejne og ved behov instrueres i udførsel af håndhygiejne.

Forholdsregler Fortsat	Service - Borgeren må få serveret mad på almindeligt service. - Snavset service håndteres med handsker på. - Service kommer direkte i opvaskemaskine.
	Tøjvask - Borgernes undertøj og håndklæder skiftes dagligt. - Sengelinned skiftes med fast interval og ved synlig forurening. - Ved tøjvask af f.eks. sengelinned, undertøj, håndklæder, snavsetøjssæk etc. samt tekstiler, der er forurenede med f.eks. blod, sårsekret, afføring, urin eller lignende, anbefales minimum 80 grader C - Anden beklædning vaskes ifølge anvisning på tøjet. - Tøjvask i fælles vaskemaskiner efterfølges af en tom 90° C vask.
	Affald - Håndteres som almindelig dagrenovation, medmindre det er stikkende, skærende eller dryppende, hvor det kasseres i en lukket pose som klinisk risikoaffald. - Drænposer, der ikke kan tømmes, bortskaffes som klinisk risikoaffald.
	Medicinsk udstyr og hjælpemidler Skal så vidt muligt være borgerbundne, og kan ikke anvendes til andre borgere, med mindre det først rengøres og desinficeres.
	Daglig rengøring på ældrecenter og botilbud - Vandrette flader i boligen (fx seng, sengebord, vindueskarne) inkl. gulvask, samt bad/toilet rengøres med almindelige rengøringsmidler. - Tæpper og møbler af stof støvsuges med borgerbunden støvsuger med HEPA filter. - Støvsugerpose og filter skiftes efter leverandørens anvisning. - Efter rengøring desinficeres kontaktpunkter fx håndtag, sengehest, vandhaner m.m. med ethanolsprit 70-85 % til overfladedesinfektion. - Spande og andet rengøringsudstyr, der har været anvendt i boligen rengøres og desinficeres.
	Rengøring i hjemmet - Der gøres rent som vanligt, men det bør dagligt sikres, at kontaktpunkter, toilet og bad er synligt rene. - Evt. spild tørres op og desinficeres med ethanolsprit 70-85 % til overfladedesinfektion.
	Rengøring ved fraflytning af bolig på ældrecenter og botilbud - Vandrette overflader og kontaktpunkter, møbler, seng, øvrigt udstyr samt bad og toilet rengøres med almindelige rengøringsmidler. - Efterfølgende skal alt, hvad der forbliver på stuen desinficeres med ethanolsprit 70-85 % til overfladedesinfektion eller kasseres. - Tæpper og møbler af stof støvsuges med støvsuger med HEPA filter. - Hvis støvsuger genanvendes hos andre borgere skal støvsugerpose og filter skiftes efter rengøringen. - Gulvet vaskes. - Gardiner vaskes
	Slut rengøring på midlertidige -/akut -/aflastningsstuer - Boligen, møbler, udstyr samt bad og toilet rengøres med alm. rengøringsmidler. - Toiletbørste kasseres, toiletrulle og andre løse toiletartikler kasseres, medmindre de er dispenseret fra lukkede kasser. - Vandrette overflader og kontaktpunkter, sengebord, udstyr og hjælpemidler rengøres og desinficeres med etanolsprit 70-85% til overfladedesinfektion. - Dyne og hovedpude vaskes. - Madrasser og overtræk rengøres og desinficeres. - Gardiner og badeforhæng vaskes. - Gulve vaskes med alm. rengøringsmidler. - Spande og andet rengøringsudstyr rengøres og desinficeres.

Transport	Ved bestilling af fælles sygetransport og taxa, må der ikke informeres om, at borgeren har CPO. Borgere med CPO kan benytte transport sammen med andre borgere, hvis nedenstående er opfyldt: • Sår skal være dækket af en tætsluttende ren og tør forbinding • Borgeren skal være iført rent tøj • Kørestolen skal være rengjort og desinficeret på kontaktflader • Borgeren skal udføre hånddesinfektion inden transporten • Hvis borgeren har en akut luftvejsinfektion, skal borgeren transporteres alene og bære mundbind. Ved bestilling af ambulance informeres om, at hvor der er behov for forflytninger eller behandlingsopgaver, skal ambulancepersonalet anvende værnemidler. Overtrækskittel er ikke nødvendig ved almindelig båretransport, hvor der ikke er direkte kontakt med borgeren
Hjælpe-midler	Ved afhentning af hjælpemidler: • Husk at informere hjælpemiddeldepotets medarbejdere om brug af værnemidler samt rengørings- og desinfektionsprocedure via Opgave til "CPO myndighed hjælpemidler"
Dokumen-tation	Oplysning om borgere med smitsomme sygdomme skal dokumenteres i Nexus -> Smitsomme sygdomme.
Kilde-henvisning	BEK nr 266 af 15/03/2017; Bekendtgørelse om håndtering af infektioner, Sundhedsstyrelsen Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO, version 1. Sundhedsstyrelsen september 2018. • Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO
Udarbejdet af	Hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland.