

# Fnat

## Forholdsregler

Den elektroniske version er den til enhver tid gældende udgave af dette dokument

<b>Generelt</b>	<p>Denne vejledning omhandler udelukkende almindelig fnat. Ved skorpefnat henvises der til specifik vejledning om dette.</p> <p>Fnat er en meget kløende hudlidelse, som er forårsaget af fnatmiden. Den er 0,20 – 0,40 mm stor og kan kun ses med lup. Især børn og unge, der er i tæt kontakt med hinanden, er udsatte for smitte.</p> <p>Personer, der mistænkes for fnat, bør altid tage kontakt med egen læge/hudlæge.</p> <p>Erfaringerne viser, at hvis først der er konstateret tilfælde med fnat, kan smitten meget hurtigt komme ud af kontrol. Derfor er det vigtigt at reagere allerede ved mistanke om fnat</p>
<b>Symptomer</b>	<p>Det mest fremherskende symptom er kløe. Kløen er værst ved sengetid, da varmen får fnatmiderne til at være mere aktive.</p> <p>Symptomerne viser sig som udslæt med små blegner eller vabler, specielt i den tynde hud ved fingermellemrummene og på fingre og håndled, ved albuer, armhuler, omkring navlen, på brystpartiet og i skridtet.</p> <p>Små børn under 3 år kan også have fnat i hårbunden og i ansigtet.</p> <p>Det klør mest der hvor miderne har slået sig ned, og der kan efterhånden ses kradsningsmærker, som kan resultere i udvikling af sår.</p> <p>Der går 2 – 6 uger fra man er blevet smittet, til det begynder at klø.</p>
<b>Smittetid</b>	<p>Fnat smitter så længe, man ikke er i behandling.</p> <p>Hvis man er blevet smittet med fnat, betragtes man som smittefri 12 timer efter påbegyndt behandling med Permethrin-creme (NIX-creme) og 24 timer efter påbegyndt behandling med Ivermectin tabletter.</p> <p>Fnatmiden kan overleve i op til én uge udenfor kroppen i varme fugtige omgivelser, f.eks. sengelinned.</p>
<b>Smittemåde</b>	<p>Almindelig fnat smitter ved tæt direkte hudkontakt med en smittet person, men der kan dog også ses smitte via tøj, møbler, tæpper, sengetøj, håndklæder m.v.</p> <p>Man bliver smittet med fnat, når befrugtede mider gnaver sig ind i huden og danner små gange. Her lægger miden sine æg. Efter 3 uger vil de befrugtede æg udklække</p>
<b>Mistanke om fnat</b>	<p>Ved mistanke om fnat hos en borger eller medarbejder kontaktes egen læge hurtigst muligt.</p> <p><u>Aktivitetstilbud, dagtilbud o.lign.</u></p> <p>Ved mistanke om fnat hos en borger eller medarbejder sendes vedkommende hjem.</p> <p>Borgeren/medarbejderen må komme igen:</p>

# Fnat Forholdsregler

Den elektroniske version er den til enhver tid gældende udgave af dette dokument

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis læge eller hudlæge afkræfter mistanken om smitte</li><li>• Hvis læge eller hudlæge bekræfter, at der er mistanke om smitte med fnat OG borgeren/medarbejderen har påbegyndt første behandling for minimum 12 timer siden med enten Permethrin-creme (NIX-creme) eller for minimum 24 timer siden påbegyndt behandling med Ivermectin tabletter.</li></ul> <p><u>Plejehjem, sygeplejen, hjemmeplejen, botilbud o.lign.</u></p> <p>Hos borgere, hvor der er mistanke om fnat anvendes værnemidler ved tæt direkte kontakt – se afsnit om værnemidler nedenfor.</p> <p>Værnemidler anvendes indtil:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Læge eller hudlæge afkræfter mistanken om smitte – dvs. herefter ingen forholdsregler</li><li>• Hvis læge eller hudlæge bekræfter, at der er mistanke om smitte med fnat OG borgeren/medarbejderen har påbegyndt første behandling for minimum 12 timer siden med enten Permethrin-creme (NIX-creme) eller for minimum 24 timer siden påbegyndt behandling med Ivermectin tabletter.</li></ul>
<b>Behandling</b>	<p>Behandlingen er enkel og effektiv. Der anvendes enten Cremor Permethrin (NIX), som kan købes i håndkøb på apoteket eller tablet Ivermectin (Scatol), som er receptpligtigt.</p> <p>Fnatbehandling med creme består af omhyggelig indgnidning med creme af hele kroppen, fra kæberande og nedefter. En tube rækker til behandling af en voksen person. Cremen påsmøres om aftenen og skal blive siddende i 12 timer, hvorefter den vaskes af med varmt vand og sæbe. Hvis hænderne bliver vasket før der er gået 8 timer, skal cremen påføres igen efter hver håndvask. Der skiftes til rent tøj og sengelinned. Børn under 3 år kan have fnat i ansigt og hårbund, så disse områder skal også behandles med NIX. Behandlingen gentages efter 7 dage.</p> <p>Fnatbehandling med tablet Ivermectin består af to orale doser, én dosis dag 0 og én dosis dag 7. Der skiftes til rent tøj og sengelinned. Tablet behandling kan være relevant ved formodning om dårlig compliance eller ved samtidig behandling af store grupper af smittede personer.</p> <p>Ved begge behandlinger kan det blive ved med at klø i op til 6 uger. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at behandlingen har svigtet. Fortsætter kløen i mere end 6 uger søges læge på ny.</p> <p><u>Tilskud til fnatmidlet NIX creme</u></p> <p>Fra d. 20. maj 2019 gives der tilskud til behandling med NIX creme, hvis egen læge udskriver det på en recept.</p> <p>Jf. Lægemedelstyrelsen gives tilskud efter de gældende regler for medicintilskud og kan</p>

# Fnat

## Forholdsregler

Den elektroniske version er den til enhver tid gældende udgave af dette dokument

	<p>gives til følgende personer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Personer, der er smittet med fnat</li><li>• Husstandsmedlemmer</li><li>• Andre, der har været i tæt kontakt med den smittede</li></ul>
<p><b>Forholdsregler overholdes indtil 24 timer efter påbegyndt behandling</b></p>	<p><b>Forholdsreglerne overholdes indtil 12 timer efter første behandling med Permethrin-creme (NIX-creme) og forholdsreglerne overholdes indtil 24 timer efter første behandling med Ivermectin tabletter – begge sæt forholdsregler gælder både ved mistanke om og ved bekræftet fnat.</b></p> <p>I primærsektoren må borgere med smitsom sygdom ikke isoleres, som under indlæggelse på hospitalet.</p> <p><u>Håndhygiejne</u> Der udføres hånddesinfektion efter kontakt med den smittede. Inden stuen forlades, skal der foretages både håndvask og hånddesinfektion.</p> <p><u>Værnemidler</u> Ved pleje og behandling samt ved rengøring i boligen (inkl. sengeredning) anvendes handsker og langærmet engangskittel over arbejdsdragten. Dette overholdes indtil 12 timer/24 timer efter påbegyndt behandling.</p> <p><u>Tøj og sengelinned</u> Efter endt behandling skal borgeren skifte tøj og sengelinned skiftes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Borgerens tøj vaskes separat fra de øvrige beboers tøj</li><li>• Tøj, håndklæder, bamses og sengetøj mv., som er brugt den seneste uge, vaskes ved minimum 60°C.</li><li>• Tøj og andet, der ikke kan tåle temperaturen, kan henstå isoleret i lukket plastpose i én uge.</li></ul> <p><u>Rengøring</u> Hjemmet rengøres ved både første og anden behandling (dag 0 og dag 7). Efter afsluttet behandling rengøres stuen på vanlig vis. Seng og madras rengøres og desinficeres efterfølgende med ethanol 70-85%. Møbler, gulvtæpper, bilsæder og lignende skal støvsuges eller man skal undgå at anvende dem i syv døgn. Overfladen på tablets, computer og mobiltelefoner rengøres. Vær opmærksom på rengøring eller henstand af f.eks. Doff n`donnor, benskiner, kørestole, liftsejl og lejringspuder</p>
<p><b>Behandling af øvrige borgere</b></p>	<p>Hvis den smittede beboer/borger har husstandslignende kontakt til andre borgere/beboere, f.eks. kæreste, bør vedkommende behandles to gange samtidigt med den smittede.</p>

# Fnat

## Forholdsregler

*Den elektroniske version er den til enhver tid gældende udgave af dette dokument*

<b>med tæt kontakt til den smittede</b>	Ved husstandslignende kontakt forstås personer, som den smittede enten har haft længerevarende hudkontakt med (fx holdt i hånd, flettet fingre med, givet massage eller haft seksuel kontakt med), eller som den smittede har delt seng, håndklæde, tøj og sko med.
<b>Personale med fnat</b>	<p>Må ikke deltage i direkte pleje- og behandlingsopgaver før henholdsvis 12 timer (Permethrin-creme/NIX-creme) eller 24 timer (Ivermectin tabletter) efter første behandling.</p> <p>Når der er konstateret fnat, bør alle i husstanden behandles. Det er vigtigt, at alle behandles samtidigt, da familiemedlemmer kan være smittet, selvom de endnu ikke har fået symptomer. Har nogen i husstanden symptomer, skal de behandles to gange med en uges mellemrum.</p> <p>Hvis personale med fnat har haft tæt hudkontakt til borgere, bør det vurderes, om disse borgere skal gennemgå en forebyggende behandling. Hvis der gives en forebyggende behandling, så skal der ikke tages forholdsregler hos disse borgere. Dvs. at der ikke skal anvendes værnemidler. Der gives kun én forebyggende behandling.</p> <p>Borgere, der har haft tæt kontakt til et personale med fnat, bør så vidt muligt behandles samtidigt. Vær opmærksom på, om øvrige borgere begynder at få symptomer (kløe, udslæt) da inkubationstiden er op til 6 uger.</p> <p><u>Forebyggende behandling til personale</u></p> <p>Personale, der har haft tæt hudkontakt med en borger med fnat anbefales at gennemgå en forebyggende behandling. Det er ikke nødvendigt at personalets husstandsmedlemmer behandles.</p>
<b>Behandling af øvrigt personale og borgere, som ikke har haft tæt kontakt til den smittede</b>	Der er ikke grund til at behandle øvrige beboere eller personale, men man bør være opmærksom på kløe og udslæt hos de øvrige personaler og beboere 3 – 6 uger efter det sidste tilfælde er behandlet, da det kan være tegn på smitte
<b>Ophævelse af forholdsregler</b>	Forholdsregler kan ophæves 12 timer efter første behandling med Permethrin-creme/NIX-creme, og 24 timer efter første behandling med Ivermectin tabletter.
<b>Kildehenvisning</b>	<p>Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren. Statens Serum Institut, Central Enhed for Infektionshygiejne, 5.1 udgave 2019.</p> <p>Håndtering af fnat på skoler og andre institutioner. Sundhedsstyrelsen 2020.</p> <p><u>Lov om epidemier m.v. (epidemiloven).</u> Lov nr. 285 af 27/02/2021.</p>

# Fnat

## Forholdsregler



Infektionshygiejne  
Center Pleje og Omsorg  
Center Sundhed, Kultur  
og Fritid  
Center Familie Handicap

*Den elektroniske version er den til enhver tid gældende udgave af dette dokument*

Sundhedsstyrelsen: [Praeparatanmeldelse-Scatol-20200501.ashx \(sst.dk\)](https://www.sst.dk/da/Fagperson/Sygdomme-lidelser-og-behandling/Sexsygdomme/Fnat)

<https://www.sst.dk/da/Fagperson/Sygdomme-lidelser-og-behandling/Sexsygdomme/Fnat>