

Forholdsregler ved borgere med Vancomysin Resistent Enterokok (VRE)

Gældende for medarbejdere i CPO, CSKF samt i Boformen Søparken, CFH.

Generelt

VRE står for **Vancomycin Resistent Enterokok** og den er modstandsdygtig over for henholdsvis antibiotika af typen vancomycin og carbapenem.

Smitte med VRE er forbundet med urinvejsinfektioner, der er vanskelige at behandle med antibiotika.

Formål	At forebygge smittespredning med VRE til borgere og personale
Symptom	Der er ikke specielle kendetegn eller symptomer på VRE, men da de begge er modstandsdygtige overfor visse typer antibiotika, kan banale urinvejsinfektioner være vanskelige at behandle. Derfor er det vigtigt, at der sendes urin til dyrkning og resistens bestemmelse ved mistanke om behandlingskrævende urinvejsinfektion.
Sygdomsperiode	Borger kan blive bærer af VRE. Det betyder, at der altid skal være ekstra opmærksomhed på at få taget urinprøve fra til dyrkning, hvis borger viser tegn på urinvejsinfektion.
Smittemåde	Kontaktsmitte via hænder, uniform m.m. - For VRE er det de generelle smitteforebyggende forholdsregler, som skal overholdes. - Dette gælder både når borger er bærer af - eller har en infektion med VRE.
Forholdsregler	Håndhygiejne - Hånddesinfektion (min. 30 sek.) efter direkte kontakt med borger eller kontaktflader. - Borger opfordres til god håndhygiejne. Værnemidler - Ved direkte kontakt med borgers udskillelser anvendes handsker og ved risiko for stænk/sprøjt til arbejdsdragten anvendes et plastforklæde over arbejdsdragten. - Ved synlig forurening med f.eks. urin eller afføring kan det være en fordel at anvende en langærmet kittel.
Udarbejdet af	Infektionshygiejnen i Region Nordjylland