

Retningslinje om undersøgelse af MRSA hos sundhedspersonale

Den elektroniske version er den til enhver tid gældende udgave af dette dokument

Undersøgelse af sundhedspersonale for MRSA	Sundhedspersonale skal lade sig undersøge, hvis de inden for de seneste 6 måneder har været i en eller flere af følgende situationer: • har arbejdet (herunder studie-/praktikophold) på hospital, i plejebolig, institution eller på klinik uden for Norden, eller har arbejdet under dårlige hygiejniske forhold, som fx i krigszoner og flygtningelejre • har arbejdet på en afdeling i Norden, hvor der har været udbrud af MRSA. Sundhedspersonale med beskæftigelse i Danmark skal endvidere lade sig undersøge hver 6. måned, hvis de: • månedligt eller oftere deltager i overflytning af patienter fra hospitaler og klinikker uden for Norden • månedligt eller oftere arbejder i sundhedssektoren uden for Norden (pendlerpersonale) • ugentligt eller hyppigere arbejder i en svinebesætning. Sundhedspersonale skal desuden lade sig undersøge, hvis de inden for de seneste 6 måneder: • har boet sammen med person, der er MRSA-positiv, har været indlagt > 24 timer og/eller fået foretaget et invasivt indgreb på et hospital uden for Norden (uanset varighed, herunder ambulante indgreb). For sundhedspersoner, der bor sammen med personer, der er MRSA-positive, gentages undersøgelsen hver 6. måned. Herudover kan arbejdsstedet efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed beslutte, at sundhedspersonalet skal undersøges for MRSA, såfremt der er flere tilfælde af MRSA (udbrud) på arbejdsstedet, jf. reglerne om tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger. I dette tilfælde skal personalet mundtligt og skriftligt informeres om: • at undersøgelse vil blive foretaget, med begrundelse herfor • at MRSA-positive personalemedlemmer vil blive instrueret om sammen med deres husstand at gennemgå en behandling for at fjerne bakterien • at MRSA-positive personalemedlemmer efter afsluttet behandling vil blive kontrolpodet mindst 5 gange • at undersøgelsesresultaterne vil blive videregivet til arbejdsgiver i overensstemmelse med dispensation fra Helbredsoplysningsloven. Sundhedspersonale, der bor på gård med svinebesætning (og ikke selv ugentligt eller oftere arbejder ved besætningen) skal kun lade sig teste, såfremt en person i husstanden er fundet MRSA-positiv. Hvis dette er tilfældet, skal man som sundhedspersonale lade sig undersøge hver 6. måned, indtil husstanden er fundet fri for MRSA.
---	--

Retningslinje om undersøgelse af MRSA hos sundhedspersonale

Den elektroniske version er den til enhver tid gældende udgave af dette dokument

	Sundhedspersonale, der har været eksponeret for MRSA i forbindelse med udbrud på arbejdspladsen, undersøges så vidt muligt før starten af dagens arbejde for at undgå, at personale, der kun er forbigående kontamineret i forbindelse med en arbejdssituation, opfattes som MRSA-bærere. Udenlandsk sundhedspersonale (eksklusiv Norden), der under ansættelse, studieophold eller lignende skal have kontakt med patienter, anbefales undersøgt for MRSA og evt. behandlet for MRSA-bærertilstand i hjemlandet. Såfremt der ikke foreligger dokumentation for MRSA-undersøgelse inden for den sidste måned, foretages undersøgelse inden start af arbejde.
Sundhedspersonale, der har fået påvist MRSA	Sundhedspersonale, der har fået påvist MRSA uanset årsag, skal oplyse arbejdsgiver herom. Oplysningspligt til arbejdsgiver i forbindelse med påvisning af MRSA, samt undersøgelse i forbindelse med udbrud på arbejdsstedet sker i medfør af dispensation fra Helbredsloven. Sundhedspersonale uden tegn til infektion kan møde på arbejdet, men de skal snarest muligt modtage mundtlig og skriftlig instruktion fra klinisk mikrobiologisk afdeling/ infektionshygiejnisk enhed/MRSA-enhed. For sundhedspersonale, der fortsat får påvist MRSA, kan ledelsen i samarbejde med den lokale infektionshygiejniske enhed vurdere, hvorvidt en eventuel omplacering til et mindre følsomt arbejdsområde kan være hensigtsmæssig.
Opfølgning	Sundhedspersonale undersøges dag 1, 7, 14 og 21 samt 6 måneder efter endt behandling. Den hyppige prøvetagning for sundhedspersonale skyldes, at man gerne vil opdage et eventuelt behandlingssvigt tidligst muligt med henblik på gentagelse af behandling.
Behandling af MRSA-bærertilstand hos sundhedspersonale	MRSA-smittet personale følger Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling af MRSA-bærertilstand. Behandlingen tager normalt 5 dage, men kan dog forlænges til 10 dage ved svælgbærertilstand. Behandlingen tilrettelægges i samarbejde med den regionale MRSA-enhed/egen læge.
Hvis man som sundhedspersonale bliver syg, skal indlægges eller opereres	Hvis man som sundhedspersonale selv bliver syg, skal indlægges eller opereres, er det vigtigt (som for alle andre MRSA-bærere) at oplyse, hvis man har fået MRSA, eller inden for de sidste 6 måneder har været i en risikosituation, f.eks. hvis en person i husstanden har MRSA eller én i husstanden arbejder med levende svin. Oplysningen skal sikre, at man får den korrekte behandling, og at personalet tager supplerende forholdsregler for at undgå spredning af MRSA.

Retningslinje om undersøgelse af MRSA hos sundhedspersonale

Den elektroniske version er den til enhver tid gældende udgave af dette dokument

Kildehenvisning	Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA. 3. udgave, Sundhedsstyrelsen, september 2016.
-----------------	--