

Faglig vejledning til behandling af anafylaktisk shock ifm. indgift af lægemiddel.

Gældende for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i Center Pleje og Omsorg samt i Boformen Søparken, Center Familie og Handicap.

Formål	At kunne iværksætte omgående behandling af allergisk shock opstået i tilslutning til indgift af lægemiddel
Definition	Allergisk reaktion i forbindelse med injektion af lægemiddel.
Forholdsregler	<p>Der er en sjælden risiko i forbindelse med enhver injektionsbehandling. Inden der gives en injektion med et lægemiddel, bør patienten udspørges, om der tidligere har været tegn på allergi i forbindelse med injektion eller indtagelse af det pågældende lægemiddel. Hvis dette er tilfældet, bør lægen rådspørges, inden injektionen gives.</p> <p>Efter injektionen bør SPL/SSA blive hos patienten i ca. 15 minutter for at observere for evt. allergisk shock.</p> <p>*OBS Adrenalin beredskab ved injektion af insulin kan undlades (Se under Lovgrundlag).</p>
Adrenalin	<p>Adrenalin skal medbringes, når der gives injektion.</p> <p>Medbring 2 ampuller ved hver inj. subcutant eller intramuskulær.</p> <p>OBS: Udløbsdato på adrenalin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udløbsdatoen er den sidste dag i den måned, som er anført på ampullen. <p>Klare ampuller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skal opbevares i køleskab. • Må opbevares i akuttasken i 5 mdr., medmindre udløbsdatoen på ampullen er før de 5 mdr., er gået. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dato for hvornår ampullerne er taget ud af køleskabet, skal stå angivet på ampullerne/posen de opbevares i. • Opbevares beskyttet mod lys og ved max. 25 grader. <p>Brune ampuller (Adrenalin ”Bradex):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skal IKKE opbevares på køl • Må opbevares i akuttasken til udløbsdatoen på ampullen • Opbevares beskyttet mod lys og ved max. 25 grader. <p>OBS: Udløbsdato på sprøjter og kanyler i posen.</p>
Symptomer på allergisk shock	<ul style="list-style-type: none"> • Kløe på kroppen, fx hovedbund, øregang, håndflader og fodsåler. • Slaphedsfølelse, svimmelhed, uro eller angst. • Åndedrætsbesvær, hæshed, varmefølelse i kroppen, hjertebanken, bleg, koldsved, evt. kvalme og opkast.
Behandling af allergisk shock	<p>Et svært, akut allergisk shock optræder oftest få minutter efter injektionen.</p> <p>Inden adrenalininjektionen gives, bør man på sædvanlig vis kontrollere, at kanylen ikke ligger i en blodåre. Vejledning i VAR følges.</p> <p>Der skal straks injiceres adrenalin injektionsvæske 1 mg/ml i følgende dosis:</p> <p>Voksne og børn ≥ 25 kg.: 0,3 mg i.m. = 0,3 ml. (Evt. gentaget)</p> <p>Børn < 25 kg.: 0,15 mg = 0,15 ml. (Evt. gentaget)</p> <p>Link: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Rationel-Farmakoterapi-1-2021/Anafylaksi-i-almen-praksis</p> <p>Injektionen gives dybt intramuskulært omkring det sted, hvor lægemidlet er givet. Dels for at modvirke absorptionen af det allergifremkaldende præparat, dels for at modvirke det allergiske shock.</p> <p>Umiddelbar efter injektion Adrenalin skal der ringes 1-1-2.</p> <p>Efterfølgende sikres korrekt lejring af patienten, liggende med benene opad for at sikre blodtilførsel til hjerte og hjerne og etabler frie luftveje.</p> <p>Hvis patientens tilstand efter nogle minutters forløb ikke er bedret væsentligt, kan det være nødvendigt at gentage injektionen med endnu en dyb intramuskulær injektion af samme dosis.</p> <p>Imens afventes ankomst af ambulance/præhospital beredskab.</p>

Kategori: Faglig vejledning

Ansvarligt center: Center Pleje og Omsorg

Ansvarlig leder: Leder af Sygeplejens Akut- og Rehabiliteringstilbud

Opdateret: 10.03.2024 (MAVE)

Version: 5

Skal opdateres igen: Ved behov og mindst én gang årligt



Lovgrundlag	Sundhedsstyrelsens ”Ophævelse af vejledning til hjemmesygeplejeordninger om behandling af akut allergisk shock med injektion af adrenalin”, d. 04.07.2017. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2017/Notat-vedr,-d,-oph%C3%A6velse-af-vejledning-til-hjemmesygeplejen.ashx?la=da&hash=3C4F43898533B226AE2E55B0FE3FA7E4833E9B7C *September 2018: Sagsnr: 4-1212-206/1 Forholdsregler ved injektion af insulin https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/forholdsregler-ved-injektion-af-insulin
Praksis konsulent	Ovenstående vejledning er drøftet og tilrettet i samarbejde med Rebild Kommunes praksiskonsulent i oktober 2021.