

Fordeling af inj. blodfortyndende medicinsk behandling



Navn:	Cpr. nr.:
Skemaet påbegyndt dato:	Måned: År:
Præparat:	
Blodfortyndende inj. i henhold til ordinationen i FMK	
Sprøjterne opbevares ved stuetemperatur	

- Der stikkes min. 5 cm under navlen
- I sprøjten vil der være en luftboble – den skal ikke udluftes.
- Tag fat i en hudfold med tommel- og pegefinger og før nålen skråt ind i hudfolden ca. 45° vinkel jf. s.c. teknik.
- Tryk meget langsomt stemplet helt i bund, træk nålen halvt ud og vent 10 sek. inden nålen trækkes helt ud.

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
--------	---------	--------	---------	--------	--------	--------

NAVLE

O

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>